

건강한 사람의 요산 수치 조절을 위한 최적의 해법

기능성 식품 원료 ‘안세린’이 제공하는
24시간 듀얼 액션의 과학적 근거

숨겨진 위험: 간과된 리스크와 시장의 공백

위험도 지표



7.0 초과

고요산혈증

의학적 개입이 필요한 영역

5.5~7.0

요산 수치 상승·변동 범위

기준치 이내지만
안심하기 어려운 영역

5.5 미만

적정 범위

시장 공백


	환자(7.0 초과)	건강한 사람(5.5~7.0)
치료	의약품을 통한 관리	식사·운동 등 생활습관 개선
지속성	의사의 관리 아래 엄격하게 시행	자기 관리에 의존
시장 현황	확립된 의약품·의료 시장	[강하게 해결하려는 솔루션이 존재하지 않는] 시장의 공백

자연에서 찾은 해법: 안세린이란?



회유어의 놀라운 지구력의 원천

참치와 가다랑어 등 장거리를 고속으로 계속 헤엄치는 **회유어의 근육에 고농도로 존재**한다. 오키나와의 「가쓰오부시」 등 전통 식재료로 오랜 역사와 식용 경험을 가지고 있다.




안세린(Anserine)의 정체

β -알라닌과 π -메틸-L-히스티딘으로 이루어진 「이미다졸 펩타이드(Imidazole Peptide)」.

항피로 작용에 그치지 않고, 최근 연구를 통해 건강한 성인을 대상으로 한 「**요산 수치 저하 작용**」이라는 새로운 기능이 임상적으로 입증되었다.

엄격한 검증: 12주 무작위 이중맹검 시험




시험 기간
12주(섭취 기간)

시험 식품
안세린 50 mg 함유
정제/일, 12주 섭취

주요 평가 항목
혈청 요산 수치 차이 및
퓨린 부하 시 반응

효과 1: 일상적인 혈청 요산 수치 감소(기저치 개선)



안세린을 꾸준히 섭취하면 건강한 사람의 일상적인 요산 수치를 확실하게 낮출 수 있습니다.

스트레스 테스트: 퓨린 부하 시험의 전체 과정


일상생활에서 발생하는 '갑작스러운 요산 상승 위험'을 모사한 엄격한 검증



「퓨린체 3.5g」은 매우 높은 부하 조건이다.

이와 같은 과도한 조건에서 안세린이 요산 수치의 급격한 상승을 얼마나 억제하고, 회복을 얼마나 촉진하는지를 검증한다.

효과 2: 식후 요산 급상승에 대한 회복력 향상



식사로 인한 일시적인 요산 급상승에도 안세린은 강력한 회복 촉진제로 작용합니다.

작용 기전: 안세린은 요산과 어떻게 상호작용하는가?

요산 대사 흐름도

유입을 줄임
(생성 억제)

배출을 촉진
(배설 촉진)

「잔틴옥시다아제(Xanthine Oxidase) 억제」 및 「HPRT 전사 활성화」에 의한 요산 생성 억제 메커니즘.

「신장 교감신경 활동 억제」를 통해 스트레스로 인한 요산 배설 저하를 차단.

단일한 접근이 아닌, 「생성되지 않도록 하고」,
「축적되지 않도록 하는」 다각적인 경로를 통해 요산 조절에 기여할 가능성.

확실한 안전성: 엄격한 안전성 검증

안전성 체크리스트




유해 사례

12주간 지속 섭취 시험에서
시험식품으로 인한
유해사례는 0건.



임상검사

문진, 이학적 검사, 혈액검사,
생화학검사, 소변검사의
모든 항목에서 임상적으로
문제가 되는 변화는
확인되지 않음.



섭취량

시험 섭취량 50mg은
참치·가다랑어 살코기
약 50g에 해당.
풍부한 식용 경험을 바탕으로
한 높은 안전성.




품질

시판 식품 원료로서
확립된 신뢰성.

장기간 매일 섭취하는 보충제 원료로서 매우 높은 안전성이 입증되었습니다.

종합: 안세린의 '24시간 요산 조절 모델'



기저치를 낮추고, 갑작스러운 상승에서 더 빠르게 회복합니다.

섭취 후 (5.5~7.0 mg/dL) 의 생활습관에 대응하는
안전하고 확실한 요산 조절 솔루션.



차세대 요산 케어 제품의 핵심 원료로